

UWAGA KLESZCZ!

Diagnostyka boreliozy



Co to jest borelioza?

Borelioza jest przewlekłą, wielofazową infekcją bakteryjną, wywołaną przez krętka *Borrelia burgdorferi*. Do zakażenia dochodzi w następstwie ukąszenia przez kleszcza. Co roku zapada na nią kilkadziesiąt tysięcy Polaków.

Lekarze ostrzegają:

Nierozpoznana i nieleczona grozi ciężkimi i nieodwracalnymi zmianami w organizmie pacjenta

Nie czekaj - zrób badania!

Badanie DNA krętka metodą PCR

w materiale od ukąszonego (kilka do 12 dni po ukąszeniu) oraz w organizmie kleszcza*

Badania serologiczne w materiale od ukąszonego

(od 4 tyg. po ukąszeniu przez kleszcza; optymalnie ok. 8 tyg.)

1. Borelioza IgM – półilościowo (metoda ELISA)

2. Borelioza IgG – półilościowo (metoda ELISA)

3. Borelioza IgM – blot (metoda Western-blot)**

4. Borelioza IgG – blot (metoda Western-blot)**

Badania serologiczne monitorujące skuteczność terapii

Przeciwciała przeciwko antygenowi VlsE/C6***

PROMOCJA
na badania

RABAT 15%
w okresie
1.06-30.09.2016

*materiał od ukąszonego do badania metodą PCR musi być wskazany przez lekarza i mieć związek z objawami klinicznymi; ujemny wynik testu PCR dla DNA krętka w organizmie kleszcza w pełni eliminuje prawdopodobieństwo zakażenia ukąszonego (wysoka ujemna wartość predykcyjna) i eliminuje potrzebę wdrożenia antybiotykoterapii

**wg. algorytmu diagnostycznego blot wykonany jest wyłącznie dla potwierdzenia wyniku wątpliwego

lub dodatniego, nie zaleca się rozpoczynania diagnostyki od blotu z pominięciem badania metodą ELISA

***optymalne jest trzykrotne wykonanie badania: w momencie rozpoczęcia antybiotykoterapii, po 6 miesiącach i po 12 miesiącach. Całkowity lub 4-krotny spadek poziomu przeciwciał świadczy o powodzeniu terapii; wynik <20 RU/ml świadczy o nieobecności infekcji; wynik > 100 RU/ml sugeruje wykonanie serii trzech oznaczeń

DIAGNOSTYKA
laboratoria medyczne
...więcej niż wynik

www.diag.pl

